

## Kommentaar 28. mai rohuproovide analüüsi alusel

Rohumassi kogus ja selle kvaliteedinäitajad jõudsid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Eelmine nädal (21. kalendrinädal) oli ilma poolest heintaimede kasvuks ja arenguks soodne. Nädalaga lisandus soojust niivõrd, et kõrrelised said optimaaseks niiteajaks vajaliku efektiivse temperatuuri summa (180-200 kraadi) Kesk- ja Põhja-Eestis kätte. Lõuna-Eesti on taimede arengu poolest nädala võrra ees.

Kuivainesisaldus oli heintaimedes endiselt väike (alla 20%), sest toimus hoogne massi juurdekasv. Kuivaine seeduvuse ja proteiinisalduse vähenemine oli tavapärane. Soovitatud alumise piirini jõudsid Põlva vanem põldhein, Halinga kerahein ja Pihtla proovid. Kiudaineid moodustus suhteliselt palju, kuid nende sisaldus ei ületanud soovitatavat taset. Äramärkimist väärrib keraheina ja põldtimuti suurem kiusisaldus.

Ilm muutus jahedaks ja vihmaseks, mis ei soodusta silotegu. Nenges tingimustes on loota siiski kvaliteedinäitajate märksa aeglasemat vähenemist.

Uued proovid võetakse analüüsimiseks 04. juunil.

Kommenteeris  
Uno Tamm  
EMVI vanemteadur