

## Kommentaar 04. juuni analüüside alusel

Rohu kasvukõrgus ületas proovivõtukohtades 60 cm (va. punane ristik). Kõrreliste põhiliigid (põldtimut, aruhein, raiheinad) ei ole jõudnud veel loomise arengufaasi, kuid vajavad kohest niitmist. Nende kuivaine seeduvus ja proteiinisaldus on vähenenud hea toiteväärtuse alampiirini.

Ilmastik oli möödunud nädalal niiske ja jahe. Efektiivset temperatuuri lisandus 31-39 kraadi, kuid toiteväärtuse vähenemine oli oluline. Liblikõieliserikkad taimikud säilitasid oma kõrge toiteväärtuse.

Kõrreliste segukülvid punase ristikuga on massi suuruse ja kvaliteedinäitajate poolest niitmiseks valmis. Tänu ristikule on proteiinisaldus veel hea. Rohu kuivainesaldus on kõikides proovides väike ja tekib lamandumise oht.

Sileerimistingimused on sellel nädalal paranenud. Õhutemperatuur hakkas tõusma ja relatiivne õhuniiskus vähenema, mis loob soodsamad tingimused massi närvutamiseks.

Uued rohuproovid võetakse 11. juunil, kuid sellest jäävad välja Põlva, Paistu, Pihla ja teiste kohtade kõrreliisterohkete taimikute proovid.

Kommenteeris  
Uno Tamm  
EMVI vanemteadur